

É fácil

A Porcilis® PCV M Hyo não traz apenas a conveniência de uma RTU pronta para uso contra o Circovirus Suíno tipo 2 (PCV-2) e *Mycoplasma hyopneumoniae* (M. hyo), mas também a flexibilidade de seu uso concomitante ou misto com outras vacinas ResPig®.

MSD Saúde Animal

As reclamações feitas por meio deste documento são consequência dos resultados observados em testes de laboratório e de campo e não constituem necessariamente uma reclamação oficial para o produto em questão. Para obter mais informações sobre o produto e suas alegações registradas, consulte o documento Resumo das Características do Produto em “Resumo das Características do Produto”

Conveniência e proteção em um único frasco

Vacinas comerciais contra PCV-2 e M. hyo estão disponíveis e são utilizadas rotineiramente na indústria suinícola. Entretanto, a administração separada destas vacinas pode exigir a mistura de componentes antes da vacinação ou resultar em múltiplas injeções em animais com maior manipulação e estresse associado.






Além disso, fatores que afetam a administração de vacinas separadas, tais como competição de antígenos e interferência ou compatibilidade entre as vacinas, precisam ser considerados.

Porcilis® PCV M Hyo, a primeira dose pronta para usar a vacina PCV e M. hyo já lançada, é a resposta da MSD Saúde Animal a estas perguntas.

Resumo das características do produto



Artistdesign29/shutterstock.com

-  Dois antígenos em um - proteção dupla em uma única vacinação.
-  Sem mistura - elimina a possibilidade de mistura incorreta de antígenos.
-  Uma dose fixa - fácil de lembrar - 2 ml*.
-  Boa seringabilidade.
-  Mais econômico, baseado no tempo de vacinação e redução do manuseio.

*Também está disponível um esquema de 2 doses x 1 ml.

Em comparação aos tratamentos tradicionais com antibióticos e antimicrobianos, que requerem sua adição em água ou ração, a via direta de administração da vacina assegura que a dose correta por animal seja garantida.

Anticorpos Derivados Maternalmente (MDA) não afetam a eficácia de Porcilis® PCV M Hyo

O uso rotineiro mais conveniente do Porcilis® PCV M Hyo é um programa de vacinação de dose única.

Porcilis® PCV M Hyo contém Emunade®, um adjuvante à base de óleo mineral, hidróxido de alumínio e conservantes que ajuda a estimular a resposta imunológica à vacinação.

Toda esta proteção, em dose única pronta para uso, injeção única a partir de 3 semanas de idade, mesmo na presença de altos níveis de imunidade materna.

Programa de vacinação de dose única

Uma única dose intramuscular de 2 ml de Porcilis® PCV M Hyo pode ser administrada a partir de 3 semanas de idade sem interferência da imunidade materna, reduzindo assim o seguinte:

- Viremia.
- Carga viral nos pulmões e nos tecidos linfóides e disseminação do vírus causado pela infecção pelo PCV-2.
- Gravidade das lesões pulmonares causadas por M. hyo.

Rara ocorrência de reações adversas

Dados internos mostraram que em mais de 1 mas menos de 10 animais em 1.000 animais injetados com a vacina contendo Emunade®, as reações locais transitórias de injeção local foram limitadas a pequenos inchaços de menos de 2 cm de diâmetro, que desapareceram dentro de 12 dias após a vacinação. O leve aumento da temperatura corporal após a vacinação voltou ao normal 1 a 2 dias após a vacinação.



Três semanas de vida é considerada uma idade ideal para vacinar leitões contra as principais doenças que devem ser controladas na suinocultura: **Circovírus suíno, pneumonia enzoótica e Ileitite**. A combinação de vacinas da MSD Saúde Animal em um único processo de vacinação traz a maior conveniência, junto com a melhor eficácia.



Sergei Drozd/shutterstock.com

Impacto da ileíte na produção

A ileíte tem um efeito sério no desempenho da produção, incluindo variações no GPD e redução da taxa de conversão alimentar. Os sintomas podem incluir diarreia e perda de leitões, mas nem todos os casos apresentam sintomas visíveis. O impacto econômico da ileíte foi estimado entre £2 milhões e £4 milhões por ano no Reino Unido.

Porcilis PCV M Hyo
Available in EU, APSA, LATAM.

Porcilis Ileititis

Available in APSA, LATAM, and NA.

Field usage suggests **Porcilis PCV M Hyo CONCOMITANT USE** with Porcilis Ileititis*

* Nenhuma reivindicação oficial foi feita.

Favor consultar seu SPC local, pois os registros podem variar por país.

